



## Pediatric Cardiology Center of Oregon

300 N. Graham St. Suite 250

Portland, Oregon 97227

Ph: (503)280-3418

Fx: (503)284-7885

[www.pccoforegon.com](http://www.pccoforegon.com)

---

### Protocolo de control de frecuencia cardíaca y taquicardia supraventricular (maniobras vagales) (SVT) - INFANTES

Mida la frecuencia cardíaca dos veces al día o si su hijo muestra signos de SVT.

Si la frecuencia cardíaca es de aproximadamente 200 latidos por minuto o más, siga el procedimiento a continuación:

1. Calme a la niña/al niño (alimentación, cambio de pañal, etc.)
2. Vuelva a mida la frecuencia cardíaca en 5 minutos.
3. Si la frecuencia cardíaca aún está elevada, probablemente sea SVT; use un termómetro rectal girando suavemente el termómetro en el recto con un movimiento circular por 20 segundos.
4. Calme al niño y vuelva a mida la frecuencia cardíaca en 5 minutos.
5. Si todavía está en SVT, volteé el niño al revés abajo suavemente durante 30 segundos (tenga cuidado con los recién nacidos para apoyar la cabeza y el cuello)
6. Si la frecuencia cardíaca aún está por más de 200 latidos por minuto, coloque hielo y agua en una bolsa de Ziplock de 1 galón y colóquela sobre toda la cara del niño. Manténgala allí por 20 segundos para sofocar; **use solo para bebés, no para niños mayores.**
7. Calme al niño y vuelva a controlar la frecuencia cardíaca en 5 minutos.
8. Si la frecuencia cardíaca es más de 200 latidos por minuto, coloque una bolsa de agua helada sobre toda la cara del niño. Manténgala allí por 30 segundos para sofocar; **úsela solo para bebés, no para niños mayores.**
9. Calme al niño y vuelva a controlar la frecuencia cardíaca en 5 minutos.
10. Si la frecuencia cardíaca aún está más de 200 latidos por minuto: Llame a la oficina de cardiología al 503-280-3418. Después de las 5:00 p.m. y los fines de semana, llame al cardiólogo pediátrico de guardia, al 503-280-3418, opción 9 para conectarse al servicio de contestador. Informe al cardiólogo de guardia quién es el cardiólogo del niño, si su hijo está tomando medicamentos para la SVT, la dosis y cuándo se administró el último medicamento. Le daremos consejos sobre cómo detener la SVT o le recomendaremos para ir a la sala de emergencias.