



Pediatric Cardiology Center of Oregon

300 N. Graham St. Suite 250

Portland, Oregon 97227

Ph: (503)280-3418

Fx: (503)284-7885

www.pccoforegon.com

INFORMACIÓN PARA DESPUÉS DEL CATETERISMO CARDÍACO

Medicamentos:

- La documentación de alta enumera todos los medicamentos que el paciente debe tomar después del procedimiento.
- Cualquier paciente al que se le haya colocado un dispositivo (ASD, VSD, PDA, dispositivos de tapón vascular) debe tomar una dosis diaria de aspirina (la dosis se basa en el peso) durante seis (6) meses después del procedimiento.
- Si es necesario, se puede administrar Tylenol y/o ibuprofeno para el dolor en los sitios de acceso del catéter inguinal en los días posteriores al procedimiento.
- A menos que el cardiólogo indique lo contrario, está bien continuar la medicación normal del paciente. La documentación de alta indicará si se debe continuar o suspender un medicamento cardíaco que el paciente estaba tomando antes del procedimiento.

Cuidado del sitio de acceso al catéter (ingle):

- Deje el apósito transparente durante tres (3) días.
- Las duchas rápidas y los baños de esponja están bien.
- No sumergirse (baños, jacuzzi, piscina) durante tres (3) días.
- Los moretones son normales y pueden localizarse en el área testicular en los niños.
- Si el sitio de acceso parece **enrojecido**, **caliente** o tiene **secreción**, notifique al consultorio de cardiología.

Sangrado en el sitio de acceso:

- Ante cualquier sangrado, primero aplique presión con una toallita o trapo ligero durante QUINCE (15) minutos SIN MIRAR (Si miras seguirá sangrando)
- Si el sangrado disminuye, limite caminar durante las próximas cuatro (4) horas para evitar más sangrado.
- Si el sangrado persiste, llame al consultorio de cardiología.

Actividad:

- Fomentar “actividades ligeras” durante los primeros (3) días después del procedimiento.
 - Caminar ligero está bien
 - No correr, saltar, andar en bicicleta, levantar pesas, clases de educación física, ejercicio, etc.
 - No deportes de contacto/colisión durante dos (2) semanas después de los implantes de dispositivos o válvulas.

Dieta:

- Volver a la dieta normal inmediatamente.
- Los pacientes pueden sentir náuseas durante 24 horas después de la anestesia. Si se producen náuseas, fomente el consumo de alimentos blandos y vuelva a una dieta normal según la tolerancia.

Vacunas:

- No es necesario posponer las vacunas después de los procedimientos de cateterismo cardíaco
- Siempre se recomienda la vacuna contra la gripe. FluMist (aerosol nasal) puede estar contraindicado según la enfermedad cardíaca subyacente del paciente; consulte a cardiología.

Visitas dentales:

- Si es posible, posponga cualquier visita al dentista durante seis (6) meses después del procedimiento.
- Si se requiere una visita al dentista antes de los seis (6) meses, consulte con el consultorio de cardiología para ver si se requieren antibióticos antes del trabajo dental (profilaxis SBE).